



HOSPITAL IBITINGA
CNPJ 05.595.597/01
Telefones 16 3341 4
Rua Pereira Landim, 514 - Centro
Ibitinga, SP - CEP 14940 000
www.hospitalibitinga.com.br



Câmara Municipal de Ibitinga
Protocolo Geral nº 637/2020
Data: 02/03/2020 Horário: 15:44
LEG - MTR 108/2020

OFÍCIO Nº 1/2020

Ibitinga, 28 de fevereiro de 2020.

ASSUNTO: Resposta ao Ofício CMI nº 38/2020 – Requerimento nº 12/2020 – Câmara Municipal de Ibitinga.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao ofício em epígrafe, esclarecemos o que segue:

1) Os serviços estão cientes dos recorrentes casos de enxaqueca após os procedimentos que utilizaram as anestésias?

A “enxaqueca” a que se refere o Vereador Tiago Piotto da Silva tem denominação de “cefaléia pós raquianestesia” (CPR).

Estima-se que entre 90% a 100% das pessoas terão algum tipo de cefaléia ao longo da vida.

As cefaléias são classificadas em primárias e secundárias. A “cefaléia pós raquianestesia” (CPR) se classifica como secundária. É descrita na literatura desde 1858. Inúmeros trabalhos têm sido publicados e a medicina vem avançando com técnicas para o fim de melhorar ou minimizar tal efeito colateral de aplicação de anestesia.

A CPR ocorre com maior frequência no adulto jovem, na faixa de 18 a 50 anos de idade, sendo sua incidência em até 5% das aplicações. Pacientes pediátricos têm incidência de até 15%; e, acima dos 50 anos, é menos comum sua ocorrência, por apresentarem pessoas idosas uma menor elasticidade dos vasos e das meninges. A gestação é um dos fatores de maior frequência deste tipo de cefaléia.

Todos os casos com queixa de cefaléia pós raquianestesia, uma vez diagnosticados, são prontamente atendidos e, caso a caso, tomadas as medidas necessárias de acordo com a medicina.



HOSPITAL IBITINGA LTDA
CNPJ 05.595.597/0001-88
Telefones 16 3341 4070 | 3341 7777
Rua Pereira Landim, 514 - Centro
Ibitinga, SP - CEP 14940 000
www.hospitalibitinga.com.br

2) Qual é a anestesia utilizada atualmente?

A raquianestesia é um tipo de anestesia utilizada de acordo com o procedimento cirúrgico.

3) Houve alguma mudança quanto à anestesia utilizada? Se sim, quando e em decorrência de qual procedimento ou causa foi feita a alteração? 4) Existe algum procedimento ou plano para sanar tal problema no futuro?

As anestésias raquidianas são aplicadas, tecnicamente, da mesma maneira pelos anestesistas e utilizadas comumente, não havendo, até o atual estágio da medicina, outra técnica conhecida que exima os pacientes de qualquer efeito colateral, tal como a cefaléia, como respondido anteriormente.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


HOSPITAL IBITINGA LTDA

Exmo. Sr.

JOSÉ APARECIDO DA ROCHA

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga - SP